

نگاهی به بهداشت جهان در آستانه قرن بیست و یکم

نویسنده: دکتر حسن فجرک^۱، دکتر علی مهرابی توانا^۲

۵۰٪ افزایش یافته است و تسبت کودکان دیستانی نیز افزایش چشم گیر نشان می‌دهد.

بطور خلاصه می‌توان گفت که جهان سال ۲۰۲۵ میلادی با جهان امروز خیلی متفاوت خواهد بود. رشد فزاینده تکنولوژی حتی مقایسه آنرا با سال ۱۹۵۰ میلادی نیز غیر قابل تصور خواهد نمود. جمعیت جهان تا سال ۲۰۲۵ به ۸ میلیارد نفر خواهد رسید یعنی در سال ۱۹۹۷ هر روز ۳۶۵۰۰۰ کودک متولد شده‌اند و ۱۴۰۰۰ انسان فوت نموده‌اند و بطور طبیعی حدود ۲۲۰۰۰ نفر به جمعیت جهان اضافه شده است.

تا پایان سال ۲۰۲۵ جمعیت افرادیکه بالای ۶۵ سال سن دارند از ۳۹۰ میلیون در سال ۱۹۹۷ به ۸۰۰ میلیون نفر در آن سال خواهد رسید (از ۶٪ به ۱۰٪ جمعیت کل جهان).

در قرن گذشته بیماری کشنده‌آبله از جهان رخت برپست و جهان عاری از ویروس این بیماری شد. در قرن آینده، جنگ بهداشتی بر علیه دو موضوع قطعی است:

۱- بیماری‌های عفونی - ۲- بیماری‌های غیر واگیر قلب و عروق
بسیاری از کشورهای در حال توسعه در معرض حمله این دو بیماری قرار خواهد داشت. بیماری‌هایی چون سرطانها، دیابت و... در زندگی انسان نقش خود را خواهند داشت. AIDS و HIV در قرن بیست و یکم با انسان خواهد بود.

در چند دهه گذشته هر چند مشکل کمبود تنفسی و فقر بهداشتی در برخی از کشورهای جهان حل نگردید لیکن موفقیت‌هایی بشرح زیر بدست آمد که بنظر می‌رسد تا سال ۲۰۲۵ میلادی این موفقیت‌ها بیشتر رشد یابند.

نوزادان و کودکان:

- در طی چند دهه گذشته میزان مرگ و میر در کودکان زیر پنج سال کاهش نشان می‌دهد. این میزان مرگ و میر در کودکان زیر پنج سال ۱۱ میلیون در سال ۱۹۹۵ بوده است که در مقایسه با میزان

در این نوشته به بررسی بهداشت جهان و جنبه‌های مختلف بهداشتی از ابعاد کمی و کیفی آن در پایان قرن بیست خواهیم پرداخت.

۱- علی رغم دو جنگ جهانی بزرگ در نیمه اول قرن بیست، میزان امید به زندگی از رشد مناسبی برخوردار بوده است. سال ۶۶ میلادی به زندگی برای سال ۱۹۹۸ در مقایسه با ۴۸ سال برای سال ۱۹۵۹ را می‌توان بعنوان یک شانص موقیت‌آمیز بهداشتی نام برد که پیش‌بینی می‌شود که این میزان به ۷۳ سال در پایان سال ۲۰۲۵ برسد. این نکته به لحاظ رشد قابل ملاحظه در تهیه آب آشامیدنی سالم، امکانات بهسازی محیط و بهداشت فردی و واکسیناسیون بوده است و بعلاوه برخی از بیماری‌های عفونی مانند فلج اطفال و جذام نیز کاهش قابل ملاحظه‌ای داشته‌اند.

۲- میزان مرگ و میر طی سال گذشته ۲۱ میلیون نفر بوده است که از این تعداد ۲ نفر از ۵ نفر قبل از سن ۵۰ سالگی درگذشته‌اند. همچنین ۱۰ میلیون کودک قبل از اینکه پنجمین سال تولد آنها فرا رسید فوت نموده‌اند. مرگ و میر $\frac{7}{4}$ میلیون نفر در بین افراد دارای سن ۲۰-۴۹ ساله رخ داده است.

۳- حداقل ۲ میلیون کودک که می‌توانستند توسط واکسیناسیون محافظت شوند، فوت نموده‌اند.

۴- هنوز نزدیک به ۸۰۰ میلیون نفر از جمعیت جهان هستند که در فقر زندگی می‌کنند و حتی از ضروری ترین نیازمندی‌های غذائی نیز برخوردار نیستند.

قرن بیست و یکم حاوی یک چشم انداز روش برای سلامت انسانها است هر چند که دست یابی به آن بدون مشارکت ملل غیرممکن بنظر می‌رسد. بعلاوه این امر مستلزم سرمایه‌گذاری سطح بالای بهداشت برای مادران و زنان از سوی دولتها می‌باشد. در این راستا پیش‌بینی می‌شود که میزان ناتوانی‌ها و معلولیت‌ها به حداقل ممکن بررسد و کیفیت سطح زندگی بالا برسد.

۵- میزان سواد آموزی افراد نسبت به سال ۱۹۷۰ تقریباً بیش از

(۱) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیة...

(۲) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیة...

علی‌رغم امکان درمان کامل و بهبودی افراد مسلول در حدود ۱/۸ میلیون نفر از افراد بالغ در سال ۱۹۹۷ در اثر ابتلاء به بیماری AIDS چنان‌خود را از دست داده‌اند و پیش‌بینی می‌شود که این میزان مرگ و میر در حال افزایش است.

در آینده کنترل بیماری‌های عفونی با واکسن امکان پذیرتر از استفاده از داروهای خواهد بود.

بطور کلی بیماری‌های سرطانها، دیابت و بیماری‌های روانی در کشورهای صنعتی رو به تراژید و بیماری‌های قلبی و سکته مغزی در اینگونه کشورهای روبرو به کاهش خواهد بود. هر چند میزان مرگ و میر در اثر ابتلاء به سرطانها افزایش یافته است.

در کشورهای در حال توسعه بیماری‌های غیرواگیر نیز در حال افزایش است و از جمله عوامل مؤثر (RISK FACTORS) می‌توان استعمال دخانیات را نام برد. بعلاوه بیماری‌های عفونی همچنان یکی از مشکلات بهداشتی اینگونه کشورها تلقی می‌شود.

سرطان بعنوان یکی از علل مرگ و میر علی‌رغم پیشرفت‌های وسیع در امر تحقیقات آن محسوب می‌شود. با تشخیص بموقع تها ۱/۳ از سرطانها قابل درمان هستند. هر چند که تعداد زیادی از سرطانها با استفاده از اقدامات بهداشتی مانند خودداری از کشیدن سیگار و رعایت اصول تنفسی و بهداشت قابل پیشگیری می‌باشد.

در سال ۲۰۲۵ میلادی روند برخی از بیماری‌ها به شرح زیر خواهد بود:

مجموعاً ریسک ابتلاء به بیماری‌های سرطانی در کشورهای در حال توسعه افزایش خواهد یافت، منتهی در کشورهای صنعتی و توسعه یافته روند ثابتی از این بیماریها بدون کاهش باقی خواهد ماند. در کشورهای صنعتی برخی از سرطانها، نسبت به بقیه از شیوه پیشتری برخوردار خواهد بود.

موارد ابتلاء و مرگ و میر ناشی از سرطان ریه بعلت استعمال دخانیات و تنفسی غیراصولی افزایش خواهد یافت و میزان مرگ و میر سرطان ریه در زنان در کشورهای صنعتی از رشد پیشتری برخوردار خواهد شد.

موارد سرطان رحم در زنان در کشورهای صنعتی به لحاظ مطالعه غربالگری (SCREENING) کاهش خواهد یافت، هر چند که استفاده از واکسن در سرطان رحم در کشورهای صنعتی و غیرصنعتی مؤثر خواهد بود.

ابتلاء به سرطان کبد بعلت اقدامات واکسیناسیون بر علیه هیاتیت نوع B در مجموع کاهش خواهد یافت.

مرگ و میر در این سن (زیر بیج سال) که ۲۱ میلیون نفر در سال ۱۹۵۹ بوده است به نصف تقلیل یافته و بینظر می‌رسد که میزان مرگ و میر کودکان زیر بیج سال در سال ۲۰۲۵ میلادی یا سیر نزولی بیشتری به ۵ میلیون نفر کاهش یابد.

- میزان مرگ و میر کودکان زیر بیج سال در سال ۱۹۵۵، ۱۹۵۸ در هزار بوده است و این میزان در سال ۱۹۹۵ به ۵۹ در هزار کاهش یافت و پیش‌بینی می‌شود که این میزان به ۲۹ در هزار تا پایان سال ۲۰۲۵ میلادی کاهش یابد.

- در سال ۱۹۹۷، از ۱۰ میلیون مورد مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال، ۹۷٪ آن در کشورهای در حال توسعه رخ داده است و بیشتر عل آن ابتلاء به بیماری‌های عفونی عاند پنومونی یا اسهال همراه با منو، تغذیه بوده است.

- بیشتر این مرگ و میرها در کودکان زیر ۵ سال قابل پیشگیری هستند. حداقل ۲ میلیون مرگ و میر از این تعداد در هر سال می‌توانستند با استفاده از واکسیناسیون پیشگیری شوند.

- تقریباً ۲۵ میلیون کودک زیر وزن طبیعی (LOW-BIRTH-WEIGHT) هر سال متولد می‌شوند. آنها بزودی یا تلف شده و یا دچار عفونت‌ها و نارسائی‌های ناشی از این بیماریها می‌شوند.

- یکی از بزرگترین خطرات برای کودکان در قرن بیست و یکم، پخش و گسترش بیماری ایدز HIV خواهد بود. در سال ۱۹۹۷، ۵۹٪ کودک زیر سن ۱۵ سال به HIV آلوده شدند.

- افراد بالغ:

در مقیاس جهانی، افراد بالغ بیشتر می‌توانند زنده بمانند و آنها بخاطر اقدامات بهداشتی در طی پنجاه سال گذشته در موقعی که آنان کودک بودند ایدمی بیماری‌های عفونی مانند بیماری سل و بیماری‌های تنفسی بهتر تحقیق کنترل قرار گرفت.

در عین حال بیشتر از ۱۵ میلیون افراد بالغ بین ۶۴-۲۰ سال هر ساله فوت می‌کنند که بیشتر این مرگ و میرها قابل پیشگیری هستند.

تراژدی این است که هر سال ۵۸۵۰۰۰ خانم حامله در اثر حاملگی و یا در حین بدنی آوردن فرزند خود جان خود را از دست می‌دهند.

سالانه بین ۳-۲ میلیون نفر در سال در اثر بیماری سل از بین می‌رونند.

روی روند بهداشت در قرن بیست و یکم نیز تأیید خواهد گذاشت.

پراکنش بیماریها و آخرین گزارشات مربوط به آنها:

بر طبق آخرین اطلاعات سازمان بهداشت جهانی (WHO) از ۵۰ میلیون مرگ و میر ثبت شده در سال ۱۹۹۷ یک سوم (۳۲٪) مربوط به وقوع بیماری در اثر مبتلا شدن به بیماریهای عفونی یا بارازیت‌ها از قبیل بیماری حاد مستقیم تنفسی، سل، اسهال، ایدز یا مبتلایان به HIV و مalaria می‌باشد. ۲۹٪ مرگ و میرها ناشی از گرفتاری مستقیم قلبی عروقی از قبیل بیماریهای کرونر قلب یا بیماریهای دریچه‌ای قلب و در حدود ۱۲٪ مرگ و میرها ناشی از انواع سرطان بوده است.

در خلال چند دهه گذشته تلاشها و پیشرفت‌های خوبی در کنترل بیماریهای عفونی صورت گرفته است، بطوریکه بعضی از این بیماریها بطور کلی ریشه کن شده و بعضی تقریباً از یک مشکل حاد سیستمهای بهداشتی خارج گشته و تعدادی نیز همچنان در حال سنجش با روشهای درمانی هستند. زمانیکه برنامه توسعه یافته WHO در سال ۱۹۷۴ جهت تعیین روشهای واکسیناسیون شروع شد، نزدیک به هشتاد درصد کودکان نسبت به بیماری‌های خطرناکی مانند دیفتری، کزان، سیاه سرفه، فلخ اطفال، سرخک و سل واکسینه شدند که نسبت به آمار ۵٪ شروع برنامه در سال ۱۹۷۴ رقم بسیار قابل توجهی است.

بیماری سل:

عای رغم مبارزه خوبی که از سه دهه پیش تاکنون در کنترل بیماری سل آغاز شده است ولی امروزه برگشت مجدد این بیماری با توانایی‌های بیشتر در همه گیری سبب شده است که هر سال نزدیک به سه میلیون نفر مرگ و میر و نزدیک به ۷/۳ میلیون موردگاهی جدید به بیماران قبلی افزوده شوند. از سال ۱۹۹۳ WHO به کلیه کشورها اخطار کرده است که سل به یک مشکل جهانی تبدیل شده است، بطوریکه هر ساله ۳ میلیون مورد جدید در جنوب شرق آسیا و دو میلیون مورد جدید نیز در شمال آفریقا گزارش می‌شود. در اروپا بدلیل فاکتورهای خطر آفرین بیشتر در شیوع بیماری ایدز یک سوم تمام بیماران مبتلا به سل کسانی هستند که قبل از HIV مشبت بوده و ثابت شده است که این افراد سبب بیشتر از سایر بیماران مستعد دریافت بیماری سل می‌باشند. در حال حاضر تخمین زده می‌شود که

ابتلا به دیابت در افراد بالغ از ۱۴۳ میلیون در سال ۱۹۹۷ به ۳۰۰ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵ میلادی خواهد رسید.

افراد مسن:

تا سال ۲۰۲۵ میلادی بیش از ۸۰۰ میلیون نفر انسان بالای ۶۵ سال در جهان وجود خواهد داشت که ۲/۳ آنها در کشورهای در حال توسعه زندگی خواهند نمود.

- تا سال ۲۰۲۵ میلادی، تنها در چین ۲۷۴ میلیون انسان بیش از ۶۰ سال وجود خواهند داشت که به تنهایی به اندازه جمعیت فعلی ایالات متحده خواهد بود.

جمعیت افراد مسن در جهان بیوئه در کشورهای آمریکای لاتین (آسیا) در طی ۳۰ سال آینده افزایش خواهد یافت (افزایش ۳۰٪).

بسیاری از بیماریهای مزمن در افراد مسن بطور موقتیت آمیز، تشخیص، پیشگیری و درمان شده و منابع مالی لازم برای تحقق آن تأمین خواهد شد.

زنان

بیش از ۵۰٪ از زنان باردار در کشورهای در حال توسعه از کم خونی (ANAEMIA) رنج می‌برند.

در حدود ۵۸۵۰۰ زن در اثر عوارض ناشی از بارداری از بین ۱۴۰۰ می‌روند. هر چند که ریسک مرگ زنان باردار اروپا ۱ در نفر زن باردار می‌باشد. در آسیا این میزان ۱ نفر به ازای هر ۶۵ نفر می‌باشد و در آفریقا یک نفر به ازای هر ۱۶ نفر می‌باشد.

تخمین زده شده است که ۵۰ میلیون نفر از زنان در کشورهای در حال توسعه بطور جدی، از کم وزنی و حدود ۴۵۰ میلیون نفر از بیماریهای گواتر (hyperthyroid) رنج می‌برند.

برنامه‌های بهداشت در قرن بیست و یکم:

مهمنترین تأکید سازمان جهانی بهداشت پرکردن فاصله (gap) بین افراد فقیر و ثروتمند است و توصیه شده است که منابع بطور مؤثر برای کسانیکه به آن نیازمند هستند هزینه شود.

تلاش سازمان جهانی بهداشت بر ریشه کنی و کنترل بیماریهای چون مalaria و سل قرار دارد و تلاش برعلیه بیماریهای نوظهور نیز شامل می‌گردد.

رشد اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی در طی ۵۰ ساله اخیر بر

می‌گردد. همچنین بعلت تحت پوشش قرلر گرفتن نیمی از کشورهای آفریقایی در مرتکب‌های واکسیناسیون شیوع و انتشار آن در این منطقه هنوز قربانیان زیادی می‌گیرد.

۶- گزارش:

سومین عامل مرگ و میر در اطفال پس از سرخک و سیاه سرفه است که این بیماری نیز از دسته بیماری قابل پیشگیری هنوز کشته است. بطوریکه در تمام کشورهای تحت پوشش WHO، به استثناء اروپا، در سال ۱۹۸۰ نزدیک به یک میلیون کودک و در ده نواد تقریباً هر سال ۷۳۰/۰۰۰ مرگ و میر از این بیماری ثبت شده است. در سال ۱۹۹۷ با تخمین WHO نزدیک به ۲۵۰/۰۰۰ مرگ و میر از این بیماری گزارش شده است.

طبق آخرین گزارش WHO این بیماری در کشورهای اروپای شرقی و غربی و آمریکای شمالی بهمراه کشورهای خاور میانه و ایران ریشه کن شده است.

۷- تراخم:

این بیماری با عدم درمان مناسب به کوری منتهی می‌شود و بعنوان یکی از اهداف مهم WHO این است که تا سال ۲۰۲۰ جهت ریشه کن نمودن کامل آن برنامه ریزی تدارک دیده است. گزارش شده است که در آفریقا و آسیا نزدیک به شش میلیون فرد نایینا در اثر ابتلاء به تراخم بیشتر خود را از دست داده و امروزه نزدیک به ۱۵۲ میلیون نفر مبتلا به تراخم در مناطق آلوده وجود دارد که تحت درمان هستند.

۸- فلج اطفال:

از سال ۱۹۹۵ که واکسن فلح اطفال بصورت تزریقی معرفی شد تاکنون که شکل مناسب ترخوراکی پیشگیری و کاربرد آن را آسان تر نموده است، بیماری در اغلب نقاط دنیا ریشه کن شده است. بیماری پولیو در کلیه کشورهای آمریکا و کشورهای همچو افغانستان اطفال ریشه کن شده ولی در کشورهای شبه قاره هند و کشورهای مرکزی و جنوب غربی آفریقا و بعضی از کشورهای شرق دریای مدیترانه هنوز بصورت آندمیک شیوع دارد. برنامه WHO ریشه کن نمودن کامل بیماری تا سال ۲۰۰۰ است.

۹- بیماری ویروسی هباتیت B:

سوشهای مایکوباکتریوم که نسبت به یک یا دو دارو عقاومت نزدیک به اینجا میلیون نفر را آلوده کرده باشدند.

۱۰- منظریت:

منطقه آندمیک منظریت که بنام «کمریند منظریت» تعلیمه شده است در آفریقا از کشور سنگال شروع شده و تا اتیوپی پا در پرگرفتن نزدیک به ۱۵ کشور و با جمعیتی در حدود سیصد میلیون نفر گسترش دارد.

۱۱- مalaria:

در سال ۱۹۵۴ نزدیک به ۴/۵ میلیون بیمار مبتلا به مalaria مسنونشی جز مرگ نداشته و شیوع بیماری نیز در بینه جهانی قریب به ۲۵۰ میلیون نفر بوده است، اما امروزه سالانه ۲/۷ میلیون مرگ و میر و نزدیک به ۳۰۰-۵۰۰ میلیون مبتلا به Malaria تخمین زده شده است که ۹۰٪ میتلایان در آفریقا بوده و بیماری در حد کشور بصورت آندمیک وجود دارد. هدف استراتژیک WHO در حال حاضر کاهش مرگ و میر بیماری حداقل به میزان ۲۰٪ مرگ و میر ثبت شده از این بیماری در سال ۱۹۹۵ و تا سال ۲۰۰۰ رسیدن به سطح ۷۵٪ ابتلاء به بیماری در این سال در کشورهای آندمیک است.

۱۲- بیماری دانگ و تب هموراژی دانگ:

این بیماری از صد کشور غیر از کشورهای اروپائی گزارش شده است. بیماری دانگ و شکل خطناک تر آن تب هموراژی دانگ (DHF) که درمان تا آخر عمر نیاز دارد در موقعی بصورت شیوع ناگهانی در کشورهای آمریکای جنوبی و جنوب شرق آسیا از قبیل بزرگیل، کوبا، هند و سریلانکا گزارش می‌شود. از آنجاییکه هنوز هیچ واکسن یا داروی مؤثری در درمان قطعی بیماری وجود ندارد، استراتژی WHO بر کنترل پیشگیری از بیماری از طریق محدودیت تماس با افراد آلوده و در مناطق آلوده است.

۱۳- سرخک:

این بیماری هنوز در بین بیماریهای قابل پیشگیری از طریق واکسن سردمته و مسبب مرگ و میر در کودکان باقی مانده و در شش ناحیه وسیع از نواحی تحت کنترل WHO شیوع دارد. بیماری، علی رغم پیشرفت‌های عالی در سالهای اخیر در جهت کنترل و پیشگیری از آن، در قاره آمریکای جنوبی هر ساله یک میلیون کودک قربانی

۱۰- بیماری ویروسی هپاتیت C:

این بیماری برای اولین بار در سال ۱۹۸۹ شناسایی شد (HCV) و در اغلب کشورهای پیشرفته همچنین بعضی از کشورهای جهان سوم مشکل عمده‌ای است. بر اساس یک گزارش تحقیقی توسط WHO نزدیک به ۳٪ جمعیت جهان به این ویروس آلوهه هستند و نزدیک به ۱۷۰ میلیون نفر حامل مخفی ویروس در کبد خود می‌باشند. تخمین زده شده است که در ایالات متحده آمریکا نزدیک به چهار میلیون بیمار وجود داشته (چهار برابر بیشتر از بیماران HIV) و هر سال در این کشور نزدیک به ده هزار نفر در اثر این بیماری می‌میرند. در فرانسه نزدیک به ۶۵۰ هزار بیمار وجود داشته و در استرالیا نیز گزارش شده است که تعداد مبتلایان به HCV بسیار بیشتر از HIV است. اگرچه این بیماری به اندازه HIV و سرعت شیوع و فراگیری ندارد ولی مدت درمان بسیار طولانی آن و گرفتاری کبد بمدت زیاد این بیماری را در زمرة بیماریهای خطرناک درآورده است.

بیماری هپاتیت B یا HBV یک مشکل جهانی است. ۶۶٪ جمعیت جهان در نقاطی زندگی می‌کنند که بیماری در آنجا شیوع دارد. بر اساس آخرین گزارش WHO نزدیک به دو میلیارد نفر در گذشته یا در حال حاضر نشانه‌ای از بیماری HBV داشته و نزدیک به ۳۵۰ میلیون نفر در کبد خود بیماری را بطور نهفته حمل می‌کنند. ویروس این بیماری در نزدیک به ۶۰-۸۰ درصد موارد علت اصلی سرطانهای کبد است که سومین عامل مرگ و میر سرطان کبد در غرب و جنوب غربی آسیا و در کشورهای حاشیه صحرای مرکزی آفریقا همچنین در مرکز آفریقا ثبت شده است. با اینحال مؤثرترین شیوه مبارزه، واکسیناسیون بر علیه HBV جهت ممانعت از انتقال بیماری است. از زمانیکه WHO به کشورها در خصوص شروع واکسیناسیون بر علیه این بیماری توصیه‌های خود را آغاز نمود ۹۰ کشور این برنامه را شروع کرده و پیش‌بینی WHO این است که تا سال ۲۰۰۱ نزدیک به ۸۰٪ کودکان از ابتلاء به این بیماری مصون خواهند شد.

References:

The world Health Report, Life in the 21st Century, a vision for all, WHO, Geneva, 1998.