

گزارش یک مورد سندروم روبین اشتاین - طبیعی (Rubinstein - Taybi Syndrome)

نویسندهان: دکتر فیروزه ساجدی^۱- دکتر کتابیون خوشابی^۲

خلاصه:

«سندروم روبین اشتاین- طبیعی» (Rubinstein - Taybi Syndrome) یا «Broad thumb Broad hallux Syndrome» اولین بار در سال ۱۹۶۳ به صورت وجود شستهای پهن در دست و پا، بینی منقاری یا برجسته، ابروان پرپشت و کمانی، مژه های بلند، کاهش رشد ماقزیلا، کام باریک و بلند، شلی مفاصل، پرمومی، کوچکی سر و عقب ماندگی ذهنی، اجتماعی و کلامی توصیف گردید. اکثر موارد بیماری به صورت منفرد می باشد و بررسی کروموزومی طبیعی است. در ۱۲-۲۵٪ موارد حذفهای کوچکی رادر ۱۶p ۱۳.۳ تشخیص داده اند. اخیراً وجود جهش هایی را در بیماران بدون حذف تشخیص داده اند. بیمار دختر ۶ ساله ای است که به علت تأخیر تکلم مراجعه نموده است. در معاینه کوچکی سر، کاهش رشد و کام باریک و بلند، دندانهای میخی شلک، بینی برجسته، لب بالای نازک، ابروان پرپشت و مژه های بلند، شلی واضح مفاصل آرنج، شستهای پهن و زاویه دار در دست باناخنها صاف، پرمومی، راه رفتن سفت و شق، تأخیر صحبت و کلام، عقب ماندگی ذهنی و اجتماعی همراه خنده های غیرطبیعی مشاهده گردید. بررسی های آزمایشگاهی، سی تی اسکن، نوار مغزی (EEG)، بررسی متابولیک و آزمایشات روتین طبیعی بود.

کلید واژه: عقب ماندگی ذهنی - کاهش رشد فک بالا - کام باریک و بلند - شستهای پهن - تأخیر تکلم

معرفی بیمار:

بازداری مشکل یا بیماری نداشته است. بیمار حاصل زایمان طبیعی و ترم بوده است. وزن هنگام تولد (LBW) $\frac{2}{3} kg$ بوده است. بیمار سابقه خفگی حین زایمان یا بیماریهای دوران نوزادی (از جمله زردی) نداشته است.

از نظر سابقه فamilی: پدر و مادر منسوب نیستند. بیمار فرزند پنجم خانواده است. سایر فرزندان طبیعی و سالم هستند. مورد مشابه در اقوام وجود ندارد.

بیمار (ن) دختر ۶ ساله ای است که به دلیل تأخیر تکلم مراجعه نموده است. والدین از ۷۵ سالگی متوجه مشکل بیمار گردیده اند. از نظر معیارهای تکاملی، کودک در ۱۰ ماهگی قادر به نشستن، در ۷۵ سالگی قادر به راه رفتن شده است، از نظر صحبت کردن، در حال حاضر جملات سه کلمه ای را ادامی کند. کودک در انجام کارهای شخصی وابستگی نسیی دارد. کنترل ادراری ندارد، سابقه تشنج ندارد. مادر بیمار در طی دوران

۱) متخصص کودکان و نوزادان. استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
۲) فوق تخصص روانپردازی کودکان. استادیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دکتر فیروزه ساجدی-دکتر کتایون خوشابی

شست دست دو طرف پهن و داراری زاویه به طرف زند اعلی است. ناخن‌های شست صاف می‌باشد. (تصویر ۳) در پاها یافته غیر طبیعی به جز کف پای صاف وجود ندارد. از نظر جلدی، پرمومی وجود دارد.

تصویر ۳: شست‌های دست پهن همراه ناخن‌های صاف



در معاینه: اندازه دور سر = ۴۸cm (میکروسفال)، قد = ۱۷cm و وزن = ۶۱kg می‌باشد. در سر و گردن: لب بالا نازک، لب پایین کلفت و برجسته است. کاهش رشد ماقزیلا و کام باریک و بلند دارد. دندانهای جلو میخی شکل است و پوسیدگی واضح همراه کاهش تعداد دندانها مشهود است. بینی برجسته (Prominent) است. ابروان پر پشت و مژه‌های بلند دارد. موهای سر رو به بالاست. گوشها پایین قرار گرفته اند (تمامی یافته‌های فوق به والدین شباهتی ندارند). (تصویر ۱)


تصویر ۱: خصوصیات سر و صورت بیمار



در معاینه دستگاه اعصاب و روان: اعصاب جمجمه‌ای، حس، مخچه و میزان تون اندامها طبیعی است. رفلکس‌های عمقد و تری مختصری افزایش یافته اند. راه رفتن بیمار سفت و شق (Stiff gait) است. از نظر صحبت کردن، در ادای حروف «ر» و «ک» مشکل دارد. کلمات را جابجا ادامی کند و حداقل جملات سه کلمه‌ای را بیان می‌کند. در بررسی میزان بهره هوشی، دچار عقب ماندگی ذهنی خفیف (IQ=۹۰) می‌باشد.

از نظر روابط اجتماعی نیز عقب ماندگی دارد گاهی خنده‌های بی مورد مشهود است. در بررسیهای آزمایشگاهی، از نظر آزمایشات روتین، بررسی تیروئید، اسید آمینه‌های سرم، بررسی از نظر فنیل کتونوری و بررسی از نظر موکوپلی ساکاریدوز طبیعی بود. بررسی کروموزومی، سی‌تی اسکن و نوار مغزی (EEG) نیز طبیعی بودند.

در معاینه قلب و ریه و شکم یافته غیر عادی وجود ندارد. در اندامها و مفاصل (آرنج)، شلی واضح مشهود است. (تصویر ۲)



بحث:

اولین بار در سال ۱۹۶۳ کودک دارای شستهای پهن در دست و پا، ناهنجاری های صورت و عقب ماندگی ذهنی توسط دکتر رو بین اشتاین و دکتر هو شنگ طبیبی (رادیولوژیست معروف کودکان در آمریکا) توصیف گردید (۲). از آن تاریخ تاکنون بیش از ۶۰۰ مورد از این سندروم گزارش شده است. (۲)

ژنتیک و نحوه توارث:

اکثر موارد بیماری به صورت اسپورادیک می باشد. موارد بسیار کمی به صورت فامیلی گزارش شده است (۲)، که خطر عود ۱٪ را در فرزندان دیگر مطرح می کند (۲). بررسی کروموزومی طبیعی است. ولی در مواردی حذفها یا شکنندگی های نقطه ای (Break Points) تحت میکروسکوپی در Human CAmp-RegulatedEnhancer- Binding protein (CREBPP) محل ژن کد کننده (CBP) وجود داشته است (۴). این پروتئین یک پروتئین هسته ای است که به عنوان کواکتیواتور در بروز ژن Regulated-CAMP شرکت دارد (۳). اخیراً وجود جهش ها (موتاسیونهایی) را در CBP بیماران بدون حذف تشخیص داده اند (۵). ظاهر (فوتیپ) بیماران با یابدون حذف بایکدیگر فرقی ندارد و در حال حاضر رخداد کلی وجود حذفهای کوچک در مطالعات مختلف، ۲-۲۵٪ بوده است. به دلیل همین رخداد پایین، پر روب RT در اثبات تشخیص ارزش دارد ولی به عنوان وسیله غربالگری (اسکرین) نباید به کار رود (۵). از نظر نحوه توارث، توارث چند ژنی به علت وجود برقخی از اشکال مختلف این سندروم در اقوام بیمار پیشنهاد گردیده است. (۴)

شیوع:

تخمین زده می شود که شیوع کلی سندروم ۷۰۰۰۰۰- ۷۳۰۰۰ می باشد. (۲) این رقم در مرآکر نگهداری کودکان مبتلا به عقب ماندگی ذهنی ۵۰۰-۵۳۰۰ می باشد. (۶)

علائم بالینی:

تظاهرات سندروم ممکن است در هنگام تولد تشخیص داده شود و حتی در دوران شیرخوارگی، فرد دارای صورت غیر

طبیعی باشد.

الف) کاهش رشد: رشد در دوران جنبینی معمولاً طبیعی است، ولی پس از تولد قدر در ۸۰٪ موارد زیر منحنی ۵٪ و وزن دور سر در تعداد زیادی زیر منحنی ۵٪ خواهد بود. درین بیمار بررسی شده، ۱۷ نفر دارای وزن پایین هنگام تولد (LBW) بوده اند. متوسط قد در سنین بزرگسالی در جنس مذکور ۱۵۳cm (۲) بوده است. متوسط قد در سنین بزرگسالی در جنس مذکور ۱۴۷cm خواهد بود، وزن متوسط در همین سنین ۵۵kg در مونث می باشد. (۳ و ۷)

ب) ناهنجاریهای جمجمه ای صورتی:

۱: صورت: بینی منقاری (Beaked nose) یا برجسته (Prominent) در ۹۰٪ موارد، انحراف سپتوم بینی در ۷۱٪، هیپرتلوریسم واضح، شکافهای پلکی (خارجی) (روبه پایین (آتنی مونگولوئید) در ۸۸٪ موارد، ناهنجاریهای محل قرار گیری، میزان چرخش، اندازه و شکل گوشها (thinckened helices) در ۸۴٪ موارد، کوچکی چانه بطور خفیف در ۴۹٪ موارد، پیشانی برجسته در ۳۳٪ موارد. (۱ و ۷ و ۱۱)

۲: چشمها و ابروان: ابروان پر پشت (۷۶٪) و کمانی (۷۳٪)، مژه های بلند (۸۷٪)، وجود چینهای اپی کانتال (۵۵٪)، انسداد یاتگی مجرای بینی اشکی (۴۳٪)، لوقی (۶۹٪)، افتادگی پلک (۳۶٪)، انوفالتمی (۲۲٪) و سایر علائم به میزان کمتر وجود دارد (۱۰٪ و ۳ و ۷ و ۱۱).

۳: دهان: کاهش رشد ماگزیلا و کام باریک و بلند (۱۰۰٪)، کوچکی دهان (۵۶٪)، نازکی لب بالا، کلفتی و برجستگی لب پایین، شکاف زیان کوچک، کام شکری. (۷ و ۱۱ و ۲)

۴: دندانها: بد قرار گرفتن (Malposition)، رویهم قرار گرفتن (Crowded)، کاهش یا افزایش تعداد (هیپو یا هیپر دنتی)، کوچکی یا بزرگی (میکرو یا ماقرو دنتی)، ۲ ردیف بودن، دندان نوزادی، پوسیدگی واضح، عدم جفت شدن صحیح (Malocclusion) (۲ و ۱۸).

۵: سر: کوچکی سر به درجات مختلف (< ۵۰٪)، ملاح قدامی بزرگ (۴۱٪) و تأخیر در بسته شدن آن (۲۴٪) (۷ و ۱۱ و ۱۰٪) دست ها: شست پهن (بخصوص در بند انتهایی) و زاویه دار (۸۷٪) که پهن بودن آن به صورت آبسلانگ یا چماقی توصیف شده و زاویه دار بودن آن به سرچکش و hitchhiker تشییه

دکتر فیروزه ساجدی-دکتر کتایون خوشابی

خون همراه هپر انسولینمی در نوزاد. (۲)
ر) افزایش سرطانها: سلطان خون (لوسمی)، آدنوم قشر آدرنال، منژیوم آثریو بلاستیک، آنژیوفیبروم، پینه آلوم نابجا، نوریل موم، لغفوم، رابدو میوسار کوم نازو فارنکس، نورو بلاستوم، الیگودن در و گلیوم، فتو کروم و موسیتوم، آدنوم پاراتیرنید، سمینوم بیضه، پیلو ماتریکوم متعدد. (۲)
ز) کلیوی: کلیه یا حالبها دوتایی، عدم وجود (آژنژی) کلیه، اتساع کلیه (هیدرون فروز)، اتساع حالب (هیدرو ویورتر) (۳)

تظاهرات رادیولوژیک:

(الف) دستها:

۱- بند انتهایی پهن و کوتاه در شستها (در گیری نسخ نرم و استخوان هر دو) وجود بریدگی یا سوراخ در انتهای فالانکس بند انتهایی که به نفع شروع دوشاخه شدن است. تغییر شکل دلتا در بند ابتدایی شستها که موجب زاویه دار شدن در ۴۰٪ موارد می شود، کوتاهی، بنه و کلافه ای بودن بند انتهایی انگشتان (در اکثربت موارد).
۲- در رادیوگرافی متا کارپو فالانژیال بند ابتدایی اول کوتاه است. (۲و۷و۱۲)

ب) پاهای: بند انتهایی کوتاه و پهن در شستها، دوتایی شدن در بند های ابتدایی و انتهایی شستها، بند دلتای شستها همراه دوتایی شدن (ابی فیزه ای متصل شده به هم)، انحراف شست پا به داخل (هالوس والگوس). (۲و۳و۲)

پ) سیستم اسکلتی (جز دستها و پاهای):

۱- سر: بزرگی سوراخ مانگونم، پیشانی برجسته، بزرگی فونتانل قدامی، سوراخهای آهیانه ای (پاریتال).
۲- تن: کاهش رشد ادونتوئید، عدم ثبات C_۳، ناهنجاریهای مهره ای، جناغ و دنده ها، کوچکی و Flaring ایلیاک (کاهش اندکس ۲۶٪)، صاف شدن زاویه استابولوم. (۲و۷و۲)
اندامها: در رفتگی آرنجهای، چسبیدن انگشتان به هم (سین داکتیلی)، انگشتان اضافه، انحراف انگشت ها، لغزش ابی فیز سر استخوان ران، حالتی شبیه بیماری پرتس، در رفتگی مادرزادی کشکک زانو. (۲)

شده است. انگشتان پهن بخصوص در بند های انتهایی (۸۷٪)، کلینوداکتیلی (انحراف) انگشتان ۴ و ۵ (۶۲٪)، کمپتو داکتیلی (خمیدگی ناهنجاریک یا چند انگشت و معمولاً با گرفتاری بند وسط) (۲۰و۳و۷) (۱۰۰٪)، انحراف انگشتان ۴ و ۵، انگشت اضافی (پلی داکتیلی) خط کف پایی عمیق بین انگشتان ۴ و ۵ (۳۳٪)، رویهم افتادن انگشتان (۴٪)، (۵۰٪)، (۷و۲و۳و۷) (۱۰۰٪)، (۲۰و۳و۷)

ج) نمو عصبی: همه بیماران دچار عقب ماندگی ذهنی با بهره هوشی بین ۳۰ تا ۵۱ (متوسط ۴۵) بوده اند. ۵۲٪ موارد بهره هوشی کمتر از ۵۰ بوده است (۱۰٪). علاوه بر این عقب ماندگی حرکتی، اجتماعی و کلامی دارند. از دیگر موارد، اشکال در مهارت های بیانی صحبت (۹۰٪)، شلی (۶۷٪)، رفلکسها (۴۰٪)، اختلالات نوار مغزی (۳۰٪)، تشنج (۲۳٪) کلیشه ای و حرکات آینه ای می باشد. (۷و۲و۱)

ج) سیستم قلبی و عروقی: نقصهای مادرزادی قلب (۲۵٪) شامل بازبودن مجرای شریانی (PDA)، ارتباط بین دو بطن (VSD) و ارتباط بین دو دهلیز (ASD) از شایعترین آنها هستند. (۹٪ و ۷٪)
ح) دستگاه تناسلی: عدم نزول (کریپتور کیدیسم) یا تأخیر نزول بیضه ها (۷۸٪)، زاویه دار شدن آلت، هیپو سپادیاس (۷٪)

خ) جلدی: پرمولی (۷۵٪) پایین بودن خط رویش موها در پشت گردن (۴۲٪) و در جلو (۲۴٪)، همانژیوم عروقی بریشانی (۲۵٪)، تمایل به تشکیل کلوئید (۲۲٪) یا تشکیل جوشگاه شدید، رویه بالا بودن موهای جلوی سر (۲۰٪)، باقیماندن پدهای جنبی در انگشتان (۳۱٪)، اثر انگشت غیر عادی، وجود خط بو زینه ای (Simian Crease) در بسیاری موارد، وجود خط کف پای بین انگشتان ۱ و ۲، صاف شدن ناخنها، کاهش رشد ناخن شست پا (۷و۲و۱)

د) سیستم عضلاتی اسکلتی: شلی مفاصل (بطور شایع)، ریاطهای شل، راه رفتن سفت و شق (۸۵٪)، Stiff، کف پای صاف (۷۲٪)، اسپینالی فیدای مخفی (۴۷٪)، کیفو اسکولیوز، قوز گردی (۳۷٪)، سینه قیفی (Pectus excavatum). (۷و۳و۲)

ذ) اختلالات غددی: بلوغ زودرس، کاهش موقت قند

درمان و پیش آگهی:

درمان بصورت علامتی و شامل کمکهای لازم برای کاستن از ناتوانی های بیمار است. اکثراً علاوه بر گفتار درمانی به فیزیوتراپی نیز احتیاج دارند. جراحی دست و پا اکثراً موجب بهبود عمل چنگ زدن (grasp) و تقابل می شود ولی واکنشهای غیرعادی به بیهوشی مثل دیسترس تفسی (بعثت مشکلات راههای هوایی، پنومونی ناشی از آسپیراسیون و اختلال عمل سیستم قلبی عروقی (از جمله آریتمی) گزارش شده است که باستی به این مسئله توجه خاصی نمود. (۷-۹)

از نظر پیش آگهی مشکلات خوردن، عفوت های تنفسی، اشکال دفع گاز و مدفع (Obstipation) در دوران شیر خوارگی شایع است. عفونت های مکرر گوش همراه کاهش خفیف شناختی مشاهده می شود (۱۰)، تمامی بیماران علائمی از عقب ماندگی ذهنی، حرکتی، تکلمی و اجتماعی دارند. سن متوسط معیارهای تکاملی در این بیماران برای خزیندن ۱۵ ماهگی، نشستن ۱۱ ماهگی، راه رفتن ۳۰ ماهگی، گفتن اولین کلمات در ۲۵ ماهگی و کنترل ادرار در ۶۲ ماهگی می باشد. ۶۷٪ بیماران دارای عسال سن یا بیشتر قادر به خواندن هستند ولی اکثر آن کلاس اول بالاتر نمی روند. (۱۰-۱۲)

طول عمر مبتلایان معلوم نیست، تعداد زیادی به بزرگسالی رسیده اند (۱). بطور کلی طول عمر به میزان عقب ماندگی ذهنی، کیفیت حمایت و آموزش کودک بستگی دارد و در مجموع کمتر از معمول می باشد. (۶)

ت) تأخیر بلوغ اسکلتی: عقب ماندگی سن استخوانی (۱۴-۲۴)

ج) سیستم گوارش: ریفلاکس معدی مری، اختلال چرخش روده ای، مگاکولون. (۲)

ج) سیستم ادراری: دو تایی بودن سیستم جمع کننده ادرار، ریفلاکس مثانه به حالب (وزیکوپورترال) (۲)

ح) سیستم عصبی: عدم وجود کورپوس کالوزوم، مalfورماسیون شبیه دندی واکر، مننگومیلوسل، نخاع دم اسبی (tethered) (۲).

تشخیص افتراقی: (۱۹-۲۰)

در دوران نوزادی سندرم لانگ و تریزومی ۱۳ مطرح است. کوچکی سر، قد کوتاه و بینی برجسته در دواور فیسم سکل (Seckle dwarfism) و سندرم کوکائین نیز وجود دارد. پنهن بودن شستهای دست و پادر سندرم فرونتو دیزیتال نیز وجود دارد ولی آنها دارای برجستگی فرونتال، یک تیغه استخوانی برجسته در سائزیتال، بهره هوشی طبیعی هستند. بعلت پرمومی، سندرم کرنلیا دلانز مطرح می شود. سندرم تریچر کولینز بعلت بینی برجسته و شکاف پلکی رو به پایین مطرح می شود.

بطور کلی از نظر وجود شست زاویه دار، سندرم آپرت (syn Apert) سندرم فایفر (Pfeiffer syn)، تریزومی ۱۳ و دیسپلازی دیاستروفیک مطرح می باشد. از نظر ظاهر صورت سندرم هالومن استریف نیز در تشخیص افتراقی مطرح است.

References:

- 1- Lewis B, Holmes, Comelia M, Mental Retardation/ An Atlas of Diseases with Associated physical Abnormalities. 1972, P:306.
- 2- Taybi H, Radiology of syndromes, metabolic disorders and skeletal dysplasias, 4th Ed, 1996, p: 436-39.

3- Emery and Rimions, Principles and practice of Medical Genetics, 3th Ed. 1997, p:2859.

4- Wallerstein R, Anderson CE. Submicroscopic deletions and 16p 13.3 in Rubinstein-Taybi Syndrome: frequency and clinical manifestations in a North America population. *J-Med-Genet*, Mar, 1997 34(3), PP: 203-6.

- 5- Taine L, Goizet C, Submicroscopic deletion of chromosome 16p 13.3 in patients with Rubinstein - Taybi Sndrome. *Am-J-Med-Genet Jul*, 1998, 78 (3), PP: 267-70.
- 6- Wiedmann MD, Kunze. Gross - An atlas of clinical Syndromes: A visual aid to diagnosis for clinicians and practising physicians, 1992, pp: 162.
- 7- Smith's Recognizable pattern of Human Malformation - 5 th Ed. 1997. p: 62-3.
- 8- Chdwick SM, Asher Mc, Dde C, The Orthodontic management of patients with profound learning disability, *Br-J- orthod*, May, 1997, 24(2), PP: 117-25.
- 9- Isayama S, Nadayama Ro. General anesthesia for and infant with Rubinsein - Taybi Syndrome, *Masui Aug*, 1997, 46(8), PP: 1094-6.
- ۱۰.اشتیاقی،ر،بلیغ،ن،اطلس ناهنجاریهای مادرزادی،۱۳۶۹،صفحات ۳۰۶-۷
- ۱۱.بوربورشیرازی،ا،فرهنگ سندرم ها،۱۳۷۰،صفحات ۷۷-۲۷۲.
- ۱۲.خلاصه مقالات اولین کنگره بین المللی ژنتیک معلولیتها،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،۱۳۷۸،صفحات ۱۰۴ و ۱.

Abstract

A Case of Rubinstein - Taybi Syndrome (RTS)

Authors: Dr. Firouzeh sajedi¹, Dr. Katayoun Khoushab²

This syndrome was first described almost 40 years ago by Rubinstein and Taybi in seven children with broad thumbs and toes, facial abnormalities (beaked nose, heavy eyebrows, long eyelashes, hypoplastic maxilla, and a narrow, high arched palate), joint laxity, hirsutism, microcephaly, and mental retardation. By 1996, more than 600 patients with this syndrome had been reported. The majority of cases are sporadic. In 25% of the cases, submicroscopic deletions in, and chromosomal study is normal. In 12 16P 13.3 is identified. Mutations have recently been identified in non-deleted RTS patients.

One case is a 6-year-old girl that was presented to us due to a speech delay. In physical examination, there are microcephaly, hypoplastic maxilla, high arched palate, talon cusps in teeth, beaked nose, a thin upper lip, heavy eyebrows, long eyelashes, joint (especially elbow) laxity, broad and angulated thumbs with flat nails, hirsutism, a stiff gait, and mental, motor, social and language retardation. Laboratory studies, including a brain C.T. scan, EEG, metabolic and chromosomal studies, and routine tests, were normal.

Key words: Mental retardation , Maxillary hypoplasia , High arched palate , Broad thumb, Speech delay

1- Assistant professor in University of Social welfare & Rehabilitation
2- Assistant professor in University of Social welfare & rehabilitation