

ارزیابی وضعیت تغذیه زنان یائسه

نویسنده: علی نعمتی کرکری^۱

چکیده:

بیان مسئله: تغذیه بهینه زنان پایه و اساس سلامتی آنهاست و تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد. کانون سلامت زنان، تغذیه آنهاست. نیازهای مسائل تغذیه‌ای زنان بر پایه متغیرهای مختلف مانند سن، مرحله رشد و تکامل، عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. علاوه بر این متغیرها زنان نیازهای مشخص و ویژه‌ای در ارتباط با قاعدگی، باروری، شیردهی و یائسگی دارند. الگوی غذای مناسب زنان تمامی مواد مغذی مورد نیاز فعالیتهای بهینه آنها را در طول زندگی فراهم می‌سازد. تغذیه صحیح نقطه اصلی و مرکزی ارتقاء بهداشت، پیشگیری از بیماریها و درمان بیماریهای است.

هدف از این بررسی: ۱- تعیین الگوی مصرف مواد غذایی زنان یائسه در شهر و روستا، ۲- تعیین میزان دریافت کالری و سایر ریز مغذيه‌های زنان یائسه و ۳- مقایسه میزان دریافت کالری و ریز مغذيه‌ها و نیز الگوی مصرف مواد غذایی زنان یائسه در شهر و روستا بود.

روش بررسی: در این بررسی ۱۲۰ زن یائسه از شهر و روستاهای اطراف اردبیل (۶۰ زن شهری و ۶۰ زن روستایی) جهت مطالعه انتخاب شدند. اطلاعات غذایی بوسیله پرسشنامه یاد آمد خوراک ۲۴ ساعته و تکرار مصرف مواد غذایی جمع آوری شد. داده‌ها بوسیله نرم افزارهای کامپیوتری SPSS و برنامه آماری ANOVA و FP2، EPI و FP2 ارزیابی شدند.

نتایج: نتایج نشان داد که دریافت کالری و پروتئین زنان روستایی از نظر آماری بیشتر از زنان شهری بود ($p < 0.05$). همچنین میزان ویتامین دریافتی زنان روستایی بیشتر از زنان شهری بود ($p < 0.01$) و دریافت آهن در زنان روستایی از نظر آماری بیشتر از زنان شهری بود ($p < 0.001$). مقادیر دریافت ویتامینهای فولاتین و A و املاح فسفر، منیزیم و سلیم در زنان روستایی از نظر آماری کمتر از مقادیر توصیه شده بهداشت جهانی بود ($p < 0.01$). میزان دریافت کالری، ویتامین A، ویتامین، فولاتین و فیبر در زنان شهری از نظر آماری کمتر از مقادیر توصیه شده بهداشت جهانی بود ($p < 0.05$). نتایج حاصل از سامد خوراک مواد غذایی نشان داد که به ترتیب غلات مخصوصاً لواش، سیب زمینی، تخم مرغ، شیر، ماست، پنیر، سیر و پیان، روغن نباتی و کره عمده غذای مصرفی زنان شهری و روستایی بود.

الگوی تغذیه زنان یائسه در شهر و روستا نزدیک هم می‌باشد. با توجه به کمبود برقی از ریز مغذيه‌ها در برنامه غذایی زنان یائسه در شهر و روستا بهبود وضعیت تغذیه میتواند نقش مؤثری در ارتقای سلامت زنان یائسه داشته باشد.

کلید واژه: وضعیت تغذیه- الگوی مصرف- زنان یائسه- روستا- شهر

ب

۲۶

تمام
۲۶ /

مقدمه:

امروزه بر هیچکس مسئله تغذیه و اثرات آن پوشیده نیست. تندرستی و سلامت کامل انسان بستگی به عوامل متعددی دارد که غذا مهمترین عامل در این زمینه می‌باشد(۱). در قانون

۱- کارشناس ارشد تغذیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

علی نعمتی کرکر

ویتامین A در زنان اغلب کمتر از میزانهای توصیه شده است (۸). با توجه به اینکه تغذیه در جلوگیری و تسريع بیماریها در دوران پس از یائسگی اهمیت دارد مانیز تصمیم گرفتیم بررسی وضعیت تغذیه زنان یائسه روستایی و شهری رادر شهرستان اردبیل انجام دهیم.

هدف از این بررسی: ۱) تعیین میزان دریافت کالری و سایر ریز مغذيهای در زنان یائسه، ۲) تعیین الگوی مصرف مواد غذایی در زنان یائسه و ۳) مقایسه میزان کالری و سایر ریز مغذيهای دریافتی و نیز الگوی مصرف مواد غذایی در زنان یائسه شهری و روستایی بود.

روش کار

این مطالعه یک مطالعه توصیفی است در این بررسی ۶۰ زن بالای پنجماه سال از شهرستان اردبیل و ۶۰ زن بالای پنجماه سال از روستاهای اطراف اردبیل (از پانزده روستا) جهت مطالعه انتخاب شدند. انتخاب نمونه به صوت تصادفی صورت گرفت. این تحقیق در بهار و تابستان ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ انجام شد. پس از انتخاب نمونه اطلاعات غذایی با استفاده از پرسشنامه یادآمد خوراک ۲۴ ساعته و بسامد مصرف مواد غذایی جهت تعیین عادات غذایی مورد استفاده قرار گرفت پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها بوسیله نرم افزارهای کامپیوتری EPI، FPT و SPSS و برنامه آماری ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

نتایج

نتایج این مطالعه نشان داد که دریافت کالری، ویتامین های B₁, B₂, B₃, B₆ و نیز املاح کلسیم و آهن و پروتئین در زنان بالای پنجماه سال روستایی بیشتر از مقادیر توصیه شده WHO بود. ولی مقادیر دریافت ویتامینهای B₂, B₆, فولاسین و A و املاح فسفر، منیزیم و سلیم در زنان روستایی از نظر آماری کمتر از مقادیر توصیه شده WHO بوده است (۱) (p < 0.001).

میزان متوسط کالری، کربوهیدرات، چربی، فیبر، ویتامین E و ویتامین B₆ دریافتی زنان روستایی به ترتیب kcal ۶۷۲/۱، ۱۹۱۷/۵، ۰/۹۷ gr، ۰/۹۷ mg و ۰/۹ mg در روز بود نسبت Na/K, Ca/P و چربی غیر اشباع با چند باند دو گانه به چربی اشباع (P:S) دریافتی در

اسلامی اعم از قرآن، حدیث، فقه و طب اسلامی بر اهمیت تغذیه و ارزش استفاده از غذاهای سالم و سازگاری با طبع انسان، رعایت اصول بهداشتی و بهبود تغذیه در اجتماع مورد توجه خاص قرار گرفته است (۲).

بطوریکه قرآن کریم در آیه ۱۷۲ سوره مبارکه بقره میرماید «یا ایها الذين آمنوا کلو من طبیعت ما رزقناکم و اشکروا الله ان کنتم ایاہ تعبدون» ای کسانیکه ایمان آورده اید از روزی حلال و پاکیزه که نصیب تان نموده ایم بخورید و خداوند راشکر گزار باشید که شماره روزی داد و تنها او را سپاس گویید اگر خداوند را خالصانه می پرستید.

تغذیه بهینه برای زنان یک پایه اساسی سلامت آنهاست و تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد کانون سلامت زنان، تغذیه آنهاست. نیازها و مسائل تغذیه ای زنان برپایه متغیرهای مختلف سن، مرحله رشد و تکامل، عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. علاوه بر این متغیرهای زنان نیازهای مشخص و ویژه ای در ارتباط با قاعدگی، باروری، شیردهی، و یائسگی دارند. الگوی غذایی مناسب زنان تمامی مواد مغذی مورد نیاز فعالیت های بهینه آنان را در طول زندگی فراهم می سازد. تغذیه صحیح نقطه اصلی و مرکزی ارتقاء بهداشت، پیشگیری از بیماریها و درمان بیماریهاست (۳). افراد پیر جامعه ممکن است بیشتر از افراد جوان در معرض کمبودهای تغذیه ای و یا مشکلاتی مراقبت سلامت قرار بگیرند. مشکلات هیجانی (emotional)، اجتماعی و جسمی ممکن است با اشتها ای افراد پیر تداخل کند و بنابراین توانایی خرید، تهیه و مصرف مواد غذایی کافی را تحت تاثیر قرار دهد (۴). مطالعات صورت گرفته نشان می دهد که دریافت مواد مغذی در افراد پیر در روزتا کمتر است (۵). مطالعات Chilima و همکاران نشان میدهد که مشکلات کم غذایی (under nutrition) یک مشکل مهم و قابل ملاحظه در بین مردم پیر در روستاهای Malawi است و شیوع کم غذایی در بین خانهها در حدود ۲۷ درصد می باشد (۶). مطالعات صورت گرفته در جاکارتا در اندونزی نشان میدهد که حدود یک سوم زنان شهری از کمبود ویتامین A رنج می برند (۷). مطالعات صورت گرفته در ایران نشان می دهد که مصرف انرژی و پروتئین حیوانی و برخی مواد مغذی بویژه آهن، کلسیم، ریوفلاوین، روی و

روستاست. همچنین مصرف برنج در زنان شهری پس از نان و سیب زمینی در رده سوم قرار داشت در حالیکه در زنان روستایی مصرف برنج کمتر بود. غذاهایی که توسط زنان در این گروه سنی کمتر مصرف می شد عبارت بودند از: خبیار شور، آجیل (فندق پسته گردو و بادام)، همبرگر، کله پاچه، کنسرو ماہی، گوشت ماہی و انواع مرباتها. همچنین در این بررسی نشان داده شد که الگوی مصرف مواد غذایی زنان یائسه شهری و روستایی مشابه هم می باشد.

جدول فوق میانگین دریافت مواد مغذی و مقایسه آن با مقداری توصیه شده بهداشت جهانی را نشان می دهد. همانطوریکه در جدول نشان داده شده است که مقدار دریافت ویتامین، فولا سین و منیزیم زنان در مقایسه با مقداری توصیه شده WHO کمتر است.

بحث

نتایج این مطالعه نشان داد که دریافت برخی از مواد مغذی از قبیل ویتامین، ویتامین فولا سین، ویتامین A، فسفر، منیزیم و

زنان روستایی به ترتیب ۱۷۶۱، ۷۳۶ و ۰/۶ بود. همچنین کالری حاصل از کربوهیدرات، پروتئین و چربی دریافتی زنان روستایی به ترتیب ۱۳، ۶۲ و ۲۴ درصد بود و (CSI) Cholesterol Sturated Index به ترتیب ۲۲/۶ بود. میزان سلنیم، روی و فسفر دریافتی زنان یائسه روستایی به ترتیب $۴/۹ \pm ۲/۸$ mg، $۲۹/۶ \pm ۱۷/۹$ mg و $۵۱۶ \pm ۴۷/۲$ mg بود.

میزان دریافت کالری، فiber، فولا سین، ویتامین و ویتامین A زنان یائسه شهری از نظر آماری کمتر از مقداری توصیه شده سازمان بهداشت جهانی بود ($p < 0/۰۵$). میزان دریافت کربوهیدرات، چربی، فiber، ویتامین و ویتامین E در زنان یائسه شهری به ترتیب $۷۰/۹ \pm ۲۳/۲$ g، $۲۵۶/۸ \pm ۴/۴$ g و $۰/۴ \pm ۰/۰۸$ mg بود در جدول مقداری دریافت کالری WHO و سایر ریز مغذيهای و مقایسه آنها با مقداری توصیه شده در زنان یائسه روستایی و شهری نشان داده شده است. همچ اخلاف معنی داری بین دریافت ویتامینهای B_۱, B_۲, B_۳, B_۶, B_۹ و فولا سین و املاح کلسیم، سلنیم، منیزیم، روی و فiber بین زنان یائسه روستایی و شهری مشاهده نشد. در صورتیکه دریافت کالری و

پروتئین زنان یائسه روستایی از نظر آماری بیشتر از زنان یائسه شهری بود ($p < 0/۰۵$). همچنین

میزان دریافت ویتامین B_۱ زنان یائسه روستایی بیش از زنان یائسه شهری بود ($p < 0/۰۱$). و نیز دریافت آهن در زنان یائسه روستایی از نظر آماری بیشتر از زنان یائسه شهری بود ($p < 0/۰۰۱$).

نتایج حاصل از بسامد مصرف مواد غذایی نشان داد که به ترتیب غلات مخصوص صanan لواش، سیب زمینی، تخم مرغ، شیر، ماست، پنیر، سیر و پیاز، روغن نباتی و کره عمده غذایی مصرف زنان یائسه در شهر و

U		R		مواد مغذی
میزان متوسط دریافت	مقایسه با مقداری توصیه WHO شده	میزان متوسط دریافت	مقایسه با مقداری توصیه شده WHO	
۷۸۰	$۱۷۰/۹ \pm ۴/۷$ kcal	۷۱۰/۷۳	$۱۹۱/۵ \pm ۷/۷$ kcal	کالری
۷۱۰/۸۶	$۵/۰/۵ \pm ۱/۰$ g	۷/۱۵۸	$۷/۱۳ \pm ۷/۱$ g	بروتئن
۷۱۴/۴۴	$۱/۳ \pm ۰/۰$ mg	۷/۸۶	$۱/۷۷ \pm ۰/۰$ mg	ویتامین B _۱
۷۷۳	$۰/۸۷ \pm ۰/۰$ mg	۷/۸۱	$۱/۰/۵ \pm ۰/۰/۱$ mg	ویتامین B _۲
۷۱۲/۷	$۱/۷/۰ \pm ۰/۰$ mg	۷/۱۵۰	$۱/۶ \pm ۰/۰$ mg	ویتامین B _۳
۷۴۷/۶	$۸/۰/۹ \pm ۰/۰/۶$ μg	۷/۶۳	$۷/۷/۹ \pm ۰/۰/۰$ μg	اسید فولیک
۷۲۰/۲۸	$۷/۷/۱ \pm ۰/۰/۶$ mg	۷/۱۶۲	$۴/۸ \pm ۰/۱/۰$ mg	ویتامین C
۷۱۸/۹۴	$۱/۸ \pm ۰/۰$ mg	۷/۲۰۰	$۲/۶/۹ \pm ۰/۰/۱$ mg	آهن
۷۱۰/۷	$۴/۷/۹ \pm ۰/۰/۷$ mg	۷/۱۰	$۴/۶/۰/۷ \pm ۰/۰/۰/۹$ mg	کلسیم
۷۱۵/۹۸	$۹/۸/۹ \pm ۰/۰$ mg	۷/۱۰	$۱/۱/۳/۸ \pm ۰/۰/۰/۷$ mg	منیزیم

علی نعمتی کرکرق

بود. ولی فولات دریافتی زنان یائسه روستایی و شهری کمتر از مقادیر توصیه شده بهداشت جهانی بود. مطالعات Quandt و همکاران روى بیوه زنان پیر نشان میدهد که بیوه زنان پیر از نظر تغذیه آسیب پذیرند^(۱۴). درآمد و وضعیت اقتصادی میتواند وضعیت تغذیه را تحت تاثیر قرار دهدن چونکه افراد پیر بیشتر در معرض کمبودهای تغذیه‌ای قرار میگیرند وضعیت اقتصادی میتواند یک اثر خوب و مطلوب روی وضعیت تغذیه افراد پیر داشته باشد. مطالعات نشان داد که میزان انرژی دریافتی زنان پیر با وضعیت اقتصادی متفاوت هیچ اثر مهمی روی وضعیت تغذیه افراد پیر ندارد^(۱۵). در مطالعه حاضر سطح انرژی دریافتی زنان یائسه روستایی از نظر آماری بیشتر از زنان شهری بود این ممکن است بخاطر فعالیت زنان روستایی و افزایش نیاز آنها بخاطر فعالیت باشد. مطالعات Shahrar و همکاران روی وضعیت تغذیه‌ای افراد پیر روستایی مالزیایی نشان داد که در تمام افراد تحت مطالعه میزان متوسط دریافت انرژی و تمام مواد مغذی (بجز پروتئین و ویتامین C زیر مقادیر توصیه شده (Malaysian Recommended Dietary Allowance) روزانه) مالزیایی بود. دریافت اکثر مواد مغذی از قبیل ویتامینهای A, B₁, B₂, B₆ و املاح کلسیم در بیش از ۵۰ درصد افراد تحت مطالعه کمتر از مقادیر توصیه شده روزانه بود. مطالعات آنها نشان میدهد که رژیم غذایی دریافتی افراد پیر مالزیایی کافی نیست^(۱۶). در مطالعه ما میزان دریافت پروتئین و ویتامین C در زنان یائسه روستایی و شهری بیشتر از مقادیر توصیه شده WHO بود و کالری دریافتی زنان یائسه روزانه میزان نیاز خود دریافت نکرده‌اند^(۱۷). در مطالعه حاضر نیز دریافت ویتامین زنان یائسه کمتر از مقدار توصیه شده WHO بود. مطالعات Marshall و همکاران روی خطرات تغذیه‌ای در جمعیت سفید پوست پیر Non-Hispanic و Hispanic نشان داد که زنان پیر Hispanic در معرض خطر فاکتورهای تغذیه بیشتری نسبت به سفید پوستان Non-Hispanic قرار دارند^(۱۸). مطالعات Andrade و همکاران در روستاهای جاکارتادر اندونزی روی ۱۱۱-۷۵ سال نشان داد که میزان انرژی دریافتی آنها کمتر از میزان نیازشان میباشد در بیش از ۷۵ درصد آنها، میزان آهن دریافتی دو سوم مقادیر توصیه شده روزانه بود و در ۲۰٪ افراد تحت مطالعه میزان فولات دریافتی کمتر از مقادیر توصیه شده روزانه بود^(۱۹). در مطالعه مانشان داد که آهن دریافتی زنان یائسه روستایی و شهری بیشتر از مقادیر توصیه شده WHO است، در حالیکه کالری دریافتی زنان یائسه روستایی بیشتر از مقادیر توصیه شده WHO و در زنان یائسه شهری کمتر از مقادیر توصیه شده WHO

سلنیم در زنان یائسه روستایی از نظر آماری کمتر از مقادیر توصیه شده بود^(۲۰)، و میزان دریافت کالری، فیبر، فولاسین، ویتامین و ویتامین A در زنان یائسه شهری نیز از نظر آماری کمتر از مقادیر توصیه شده بهداشت جهانی بود^(۲۱). که نشان دهنده کمبود برخی از مواد مغذی در برنامه غذایی زنان یائسه است.

مطالعات صفوی و همکاران در سال ۱۳۷۵ روی وضعیت تغذیه سالماندان در مجتمع صادقیه اصفهان نشان داد که دریافت کالری و پروتئین آنها قابل قبول می‌باشد^(۹). همچنین مطالعات کاسب و همکاران روی وضعیت تغذیه سالماندان آسایشگاه نشاط استان یزد نشان داد که میزان دریافت آهن و پروتئین خانمهای سالماند بعفور معنی داری پایین تراز مقادیر توصیه شده روزانه (RAD) می‌باشد^(۱۰). در مطالعه ما پروتئین و آهن دریافتی زنان شهری و روستایی از نظر آماری بیشتر از مقادیر توصیه شده WHO بود، در حالیکه میزان کالری دریافتی زنان یائسه روستایی بیشتر از مقادیر توصیه شده WHO بود. مطالعات لامیار کوعی و همکاران نشان داد که سالماندان شهر تهران در مورد اکثریت مواد مغذی خصوصاً ویتامینهای B₂, B₆ و D چار کمبود بود و به میزان نیاز خود دریافت نکرده‌اند^(۱۱). در مطالعه حاضر نیز دریافت ویتامین زنان یائسه کمتر از مقدار توصیه شده بود. مطالعات Marshall و همکاران روی خطرات تغذیه‌ای در جمعیت سفید پوست پیر Non-Hispanic و Hispanic نشان داد که زنان پیر Hispanic در معرض خطر فاکتورهای تغذیه بیشتری نسبت به سفید پوستان Non-Hispanic قرار دارند^(۱۲). مطالعات Andrade و همکاران در روستاهای جاکارتادر اندونزی روی ۱۱۱-۷۵ سال نشان داد که میزان انرژی دریافتی آنها کمتر از میزان نیازشان میباشد در بیش از ۷۵ درصد آنها، میزان آهن دریافتی دو سوم مقادیر توصیه شده روزانه بود و در ۲۰٪ افراد تحت مطالعه میزان فولات دریافتی کمتر از مقادیر توصیه شده روزانه بود^(۱۹). در مطالعه مانشان داد که آهن دریافتی زنان یائسه روستایی و شهری بیشتر از مقادیر توصیه شده WHO است، در حالیکه کالری دریافتی زنان یائسه روستایی بیشتر از مقادیر توصیه شده WHO و در زنان یائسه شهری کمتر از مقادیر توصیه شده WHO

نتیجه گیری:

الگوی غذای زنان یائسه در شهر و روستا نزدیک هم می باشد، با توجه به کمبود برخی از ریز مغذيهای در برنامه غذایی زنان یائسه در شهر و روستا، بهبود وضعیت تغذیه می تواند نقش موثری در ارتقاء سلامت زنان یائسه داشته باشد.

تغذیه و بهداشت زنان، چکیده مقالات همايش سراسری فرهنگ مصرف غذا و دارو، ساری ۲۷-۲۹ مهرماه ۱۳۷۹

از زنان شهری می باشد.

مطالعه Mennen و همکاران نشان می دهد که دریافت انرژی، چربی و الكل در زنان روستایی در کامرون بیشتر از زنان شهری است. همچنین کربوهیدرات و پروتئین دریافتی زنان روستایی بیشتر از زنان شهری بود. دریافت فیبر، آهن، کاروتون، روی، پتاسیم و ویتامینهای D و E در زنان روستایی بیشتر از زنان شهری بود(۱۹). مطالعه حاضر با این مطالعه همخوانی دارد.

منابع:

بر آن در سالمندان ساکن شهر تهران در سال ۱۳۷۶، خلاصه جامع طرحهای تحقیقاتی حاممه یافته استیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور و پایان نامه های دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، ۱۳۷۶-۷۸.

12- Marshal JA., Lopoiz TK., Sheterly SM., et al. Indicators of nutritional risk in a rural elderly Hispanic and non-Hispanic white population: San Luis Valley Hralth and Aging Study, J Am Diet Assoc, 1999,99(3):315-22.

13- Anderade-Juguan J., Lukito W., Schultink W., Thiamine deficiency is prevalent in a selected group of urban Indonesian elderly people, J Nutr, 1999, 129(2): 366-71.

14- Quandt SA., McDonald J.,Arcury TA.,et al. Nutritional self- management of elderly widows in rural communities, Gerontologist, 2000, 40(1):86-96.

15- Gattas V., Cifuentes M., Gajardo H., et al. Nutritional status and energy expenditure in elder of differing socioeconomic level, Rev Med Chil, 1999,127(5):557-64

16- Shahar S., Earland J., Powers HJ., Rahman SA., Nutritional status of rural elderly Malays: dietary and biochemical findings , Int J Vitam Nutr Res, 1999,69(4): 277-84

17- Allain TJ., Wilson AO.,Gomo ZA.,Adamchak DJ., et al. Diet and nutritional status in elderly Zimbabweans, Age and Aging, 1997,26(6):463-70.

18- Qu JB., Zhang ZW., Shimbo S., et al.Nutrient intake of adult woman in Jilin Province, China, with special to reference urban- rural differences in nutrition in the Chinese continent, Eur J Clin Nutr, 2000, 54(10): 741-8.

19- Mennen LI., Mbanya Jc., Cade J., et al.The habitual diet in rural and urban cameroon, Eur J Clin Nutr, 2000, 54(2): 150-4

۱- شکر زاده لموکی م، جاوید نیا ح، بررسی یادآمد خوراک ۲۴ ساعته ۴۰ کودک در شهرستان ساری، چکیده مقالات همايش سراسری فرهنگ مصرف غذا و دارو، ساری ۲۷-۲۹ مهرماه ۱۳۷۹

۲- آیت اللهی س، م، ت، تغذیه از دیدگاه اسلام، چکیده مقالات همايش سراسری فرهنگ مصرف غذا و دارو، ساری ۲۷-۲۹ مهرماه ۱۳۷۹

۳- احمدی ب، تغذیه و بهداشت زنان، چکیده مقالات همايش سراسری فرهنگ مصرف غذا و دارو، ساری ۲۷-۲۹ مهرماه ۱۳۷۹

4- Shil ME., Olsan, JA., Shik M., ct al. Modern Nutrition in Healt and Disease, 9nded Lippincott Williams & Wilkins, 1999, PP:869.

5- Lee CJ., Templeton S.,Wang C., Meal skipping patternd and nutrient intakes of rural Southern elderly, J Nutr Elder, 1996,15 (2): 1-14

6- Chilima DM., Ismail SJ., Anthropometric characteristics of older people in rural Malawi, Eur J Clin Nutr, 1998, 52(9): 643-90

7- Gross R., Schultink W., Micronutrient deficiency in urban Indonesia, Archivos Latinoamericanos de Nutricion, 1997,47 (2 Suppl): 50-3.

۸- امیدواران امین پور آ، اشاری ش، مروری بر وضعیت تغذیه ای زنان کشور، فهرست تشریحی مقالات تغذیه ای کشور، ۱۳۷۳-۷۴.

۹- صفوی س م، عزیززاده ا، کاظمی ر، بررسی وضعیت تغذیه سالمندان مجتمع صادقیه اصفهان، چهارمین کنگره تغذیه ایران، امنیت غذا و تغذیه: از علم تا عمل، تهران ۱۴-۱۷ آبانماه ۱۳۵۷

۱۰- کاسب ف، اشرافیان م، طالبان ف، بررسی وضعیت تغذیه سالمندان آسایشگاه نشاط استان بزد، پنجمین کنگره تغذیه ایران، امنیت غذا و تغذیه خانوار، تهران ۲۲-۲۵ شهریور ۱۳۷۸.

۱۱- کووعی ل و کیمیاگر م، بررسی الگوی مصرف مواد غذایی و عوامل موثر



Abstract

Assessment of nutritional status in post menopause women

Author: A Namati karkaragh

Optimal nutrition for women is based on health and influence by variety of factors. Nutrition of women is the health them. Nutritional needs and concers of women are based on a varity of determinates such as age, stage of growth and development,socioeconomic, and cultural factors. Furthermore, women's need specific have associated with menstruation, pregnancy, lactation and menopause. The appropriate pattern for women supplies adequate amounts of all nutrients essential for life and optimal function. Optimal nutrition is point of health promotion, prevention and treatment of disease. The aim of this study was determine and comparison dietary pattern, calorie and other nutrients intake in menopause women in rural and urban of Ardebil district.

120 menopause women of rural and urban (60 of rural and 60 urban) of Ardebil distric were select for study. Food frequency and 24 hour recall was use nutritional study. Data analyzed with Fp2,Epi6,SPSS and ANOVA.

The mean of calorie and protein intake in rural menopause women was more than urban menopause women ($p<0.05$), also intake of vitamin B3 in rural women was more than urban women ($p<0.01$). The mean of iron intake in rural women was more than urban women ($p<0.001$). The mean of vitamin (B2,B6,folacin and A) and minerals (phosphorous,magnesium and selenium) intake in rural women were less than recommended dietary of WHO ($p<0.001$). Then mean of calorie, vitamin (A,B2, and folacin) and fiber intake in urban women were less than recommended dietary of WHO ($p<0.05$). Food frequeney questionnaire was show cereal, particularly domestic bread (Lavash), potato, egg, milk, yogurt, cheese, garlic and onion, vegetables oil and butter the most of food intake in menopause women in rural and urban, respectively.

Dietary pattern in menopause women was similar in rural and urban. There was some nutrients deficiency in food program of menopause women. Therefore,improve of nutritional status effect can promotion of health menopause women in rural and urban.

Keyword: Nutritonal status- Consumption pattern- Menopause women- Rural- Urban.